



1° causa di invalidità

2° causa di demenza

3° causa di morte

Ogni 6 secondi una persona nel mondo viene colpita da ICTUS, indipendentemente dall'età o dal sesso.

In Italia ogni giorno 660 persone, circa 240.000 ogni anno, vengono colpite da ICTUS.



2 ICTUS su 3, potrebbero essere evitati con stili di vita adeguati ed individuando alcuni importanti fattori di rischio come la **pressione arteriosa**, la **fibrillazione atriale**, il diabete o l'ipercolesterolemia. Le persone con un profilo di rischio elevato possono prevenire l'ICTUS con trattamenti mirati e personalizzati.

Si crede che l'ICTUS colpisca solo gli anziani, ma in Italia esistono più di **30.000 persone giovani** che sono state colpite, anche in modo invalidante.

Il costo medio annuo delle prestazioni sanitarie per paziente con ICTUS è di 3.848 Euro.

Considerando le stime attuali, è stato possibile effettuare una valutazione globale dei costi diretti dell'ICTUS in Italia in circa **3,7 miliardi di Euro** per anno, quasi il **4% dell'intera spesa sanitaria** nel nostro Paese.

I numeri della FIBRILLAZIONE ATRIALE



La FIBRILLAZIONE ATRIALE è **responsabile del 20% dei casi di ICTUS** ed è quindi la **causa principale** di questa complicanza vascolare.

Individui con FIBRILLAZIONE ATRIALE hanno **un rischio di ICTUS superiore da 3 a 5 volte** rispetto ai pazienti senza FIBRILLAZIONE ATRIALE.

La mortalità e l'invalidità sono superiori nei casi di ICTUS associato a FIBRILLAZIONE ATRIALE rispetto a quelli senza.

La FIBRILLAZIONE ATRIALE è **spesso asintomatica e non viene diagnosticata precocemente**.

Recenti studi hanno stabilito che in **oltre il 10% degli ICTUS la FIBRILLAZIONE ATRIALE è asintomatica**. In questi casi la prima diagnosi di FIBRILLAZIONE ATRIALE avviene **solo dopo aver subito un ICTUS**.

I numeri della FIBRILLAZIONE ATRIALE

La FIBRILLAZIONE ATRIALE è un'anomalia del ritmo cardiaco, la cui frequenza **aumenta con l'aumentare dell'età**. L'incidenza della FIBRILLAZIONE ATRIALE è di circa lo 0,5% nella popolazione intorno ai 50 anni, ma aumenta **fino al 10% nei soggetti con più di 65 anni**.

In Italia si calcola che i **soggetti con FIBRILLAZIONE ATRIALE** siano più di **500.000**, con circa **60.000 nuovi casi ogni anno**.

